

レジメン名称 : SCLC Durvalumab + CDDP+VP-16

適応がん種 : SCLC  
 インターバル日数 : 21日  
 予定コース数 : 4コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day()	day()	day()	day()	day()
1		ソルデム1輸液 500mL KCL注シリンジ 10mEq 硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 20mL	1本 1キット 8mL	点滴静注	末梢メイン	90分	9:00							
2		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分	10:30							
3		生理食塩液 1000mL	1本	点滴静注	末梢メイン	10時間	12:00							
4		イメンドカプセル 125mg	1C	内服	経口	※生食開始時に	12:00							
5		イメンドカプセル 80mg	1C	内服	経口			午前中	午前中					
6	*	イミフィンジ点滴静注 生理食塩液 100mL	1500mg/body 1本	点滴静注	末梢側管	1時間 ※インラインフィルター使用	12:00							
7		デキサート注(デキサメタゾンとして) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	9.9mg 1本	点滴静注	末梢側管	15分	13:00							
8		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	6時間		10:00	10:00					
9		デキサート注(デキサメタゾンとして) 生理食塩液 50mL	6.6mg 1本	点滴静注	末梢側管	15分		10:00	10:00					
10	*	エトポシド点滴静注液 生理食塩液 500mL	100mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	末梢側管	2時間	13:15	10:15	10:15					
11	*	シスプラチン注 生理食塩液 500mL	80mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	末梢側管	2時間 ※総量500mL	15:15							
12		20%マンニトール注射液 300mL	1本	点滴静注	末梢側管	30分	17:15							
13		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間	22:00							
14		ヘパリンNaロック用シリンジ 500単位	1本	ヘパリンロック		点滴終了時		○						

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
6	イミフィンジ点滴静注	1500mg/body	
10	エトポシド点滴静注液	100mg/m <sup>2</sup>	
11	シスプラチン注	80mg/m <sup>2</sup>	

<備考>

--