

レジメン名称 : SCLC Durvalumab+CBDCA+VP-16

適応がん種 : SCLC  
 インターバル日数 : 21日  
 予定コース数 : 4コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day()	day()	day()	day()	day()
1		イメンドカプセル125mg	1Cp	内服	経口		9:00							
2		イメンドカプセル80mg	1Cp	内服	経口			午前中	午前中					
3		生理食塩水 250mL	1本	点滴静注	末梢メイン	6時間	10:00	10:00	10:00					
4 *		イミフィンジ点滴静注 生理食塩液 100mL	1500mg/body 1本	点滴静注	末梢側管	1時間 ※インラインフィルター使用	10:00							
5		デキサート注(デキサメタゾンとして) グラニセトロンバッグ 3mg	3.3mg 1本	点滴静注	末梢側管	15分	11:00							
6		デキサート注(デキサメタゾンとして) 生理食塩液 50mL	3.3mg 1本	点滴静注	末梢側管	15分		10:00	10:00					
7 *		エトポシド点滴静注液 生理食塩液 500mL	100mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	末梢側管	2時間	11:15	10:15	10:15					
8 *		カルボプラチン点滴静注液 生理食塩液 500mL	AUC5 1本	点滴静注	末梢側管	2時間	13:15							
9		ヘパリンNaロック用シリンジ 500単位	1本	ヘパリンロック		点滴終了時	○	○						

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
4	イミフィンジ点滴静注	1500mg/body	
7	エトポシド点滴静注液	100mg/m <sup>2</sup>	
8	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	400mg/m <sup>2</sup>

<備考>