

レジメン名称 : NSCLC Pembrolizumab+CDDP+PEM

適応がん種 : NSCLC
 インターバル日数 : 28日
 予定コース数 : 4-6コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day()	day()	day()	day()
1		ソルデム1輸液 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分	9:00						
		KCL注シリンジ 10mEq	1キット										
		硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 20mL	8mL										
2		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分	10:30						
3		生理食塩液 1000mL	1本	点滴静注	末梢メイン	10時間	12:00						
4		イメンドカプセル 125mg	1C	内服	経口	※生食開始時に	12:00						
5		イメンドカプセル 80mg	1C	内服	経口			午前中	午前中				
6	*	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	末梢側管	30分	12:30						
		生理食塩液 100mL	1本			※インランフィルター							
7		デキサート注(デキサメタゾンとして)	9.9mg	点滴静注	末梢側管	15分	13:00						
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1本										
8	*	アリムタ注射用	500mg/m ²	点滴静注	末梢側管	10分	13:15						
		生理食塩液 100mL	1本										
9	*	シスプラチン注	75mg/m ²	点滴静注	末梢側管	2時間	13:25						
		生理食塩液 500mL	1本			※総量500mL							
10		20%マンニトール注射液 300mL	1本	点滴静注	末梢側管	30分	15:25						
11		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間	22:00						
12		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢メイン	30分		10:00	10:00				
		生理食塩液 100mL	1本										
13		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	2時間		10:30	10:30				
14		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	2時間		12:30	12:30				
15		ヘパリンNaロック用シリンジ 500単位	1本	ヘパリンロック		点滴終了時		○					

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
6	キイトルーダ	200mg/body	
8	アリムタ注射用	500mg/m ²	
9	シスプラチン注	75mg/m ²	

<備考>
 ・メチコバルル注2A:アリムタ開始の1週間7日前に筋注し、以後9週おきに筋注。
 ・パンビタン末1g:アリムタ開始の7日以上前から内服開始。