

レジメン名称：NSCLC CBDCA+Nab-PTX(入院)

適応がん種：NSCLC
 インターバル日数：21日
 予定コース数：

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(8)	day(15)	day()	day()	day()
1		イメドカプセル125mg	1cp	内服	経口		9:00							
2		イメドカプセル80mg	1cp	内服	経口			午前中	午前中					
3		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	6時間	10:00			10:00	10:00			
4		デキサート注(デキサメタゾンとして) グラニセトロンバッグ 3mg	3.3mg 1本	点滴静注	末梢側管	15分	10:00							
5		デキサート注(デキサメタゾンとして) 生理食塩液 50mL	6.6mg 1本	点滴静注	末梢側管	15分				10:00	10:00			
6		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢側管	5分	10:15			10:15	10:15			
7 *		アブラキサン点滴静注用 生理食塩液 50mL	100mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管	30分	10:20			10:20	10:20			
					※5mg/mLの懸濁液が投与量分入ったものをNS50mLの空ボトルに詰めて払い出し									
8		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢側管	5分	10:50			10:50	10:50			
9 *		カルボプラチン点滴静注液 生理食塩液 500mL	AUC5 1本	点滴静注	末梢側管	2時間	10:55							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
7	アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	
9	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	400mg/m ²

<備考>