

レジメン名称 : NSCLC Atezolizumab+Bev+CBDCA+PTX<初回用>
(Bev90分,Atezolizumab60分)

適応がん種 : NSCLC
 インターバル日数 : 21日
 予定コース数 : 4-6サイクル

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day()	day()	day()	day()	day()
1		イメンドカプセル125mg	1cp	内服	経口		9:00							
2		イメンドカプセル80mg	1cp	内服	経口			午前中	午前中					
3		生理食塩液250mL	1本	点滴静注	末梢メイン	8時間	9:00							
4 *		テセントリク点滴静注 生理食塩液250mL	1200mg/body 1本	点滴静注	末梢側管	1時間 ※インラインフィルター	9:00							
5 *		アバスチン点滴静注用 生理食塩液 100mL	15mg/kg 1本	点滴静注	末梢側管	90分	10:00							
6		デキサート注(デキサメタゾンとして) ポラミン注 5mg ラニチジン注 100mg グラニセトロンバッグ 3mg	6.6mg 1A 0.5A 1本	点滴静注	末梢側管	15分	11:30							
7 *		パクリタキセル点滴静注液 5%ブドウ糖液 500mL	180mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管	3時間 ※インラインフィルター	11:45							
8 *		カルボプラチン点滴静注液 生理食塩液 500mL	AUC5 1本	点滴静注	末梢側管	2時間	14:45							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
4	テセントリク点滴静注	1200mg/body	
5	アバスチン点滴静注用	15mg/kg	
7	パクリタキセル点滴静注液	180mg/m ²	
8	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	400mg/m ²

<備考>