

レジメン名称：NSCLC Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PTX(初回)

適応がん種：NSCLC
 インターバル日数：21日
 予定コース数：1コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day()	day()	day()	day()	day()
1		イメドカプセル125mg	1cp	経口	内服		9:00							
2		イメドカプセル80mg	1cp	経口	内服			午前中	午前中					
3		生理食塩液250mL	1本	点滴静注	末梢メイン	4時間	10:00							
4 *		オブジーボ点滴静注用 生理食塩液 100mL	360mg/body 1本	点滴静注	末梢側管	30分	10:00							
								※インランフィルター使用。total100mLにする。						
5		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢側管	30分	10:30							
6 *		ヤーボイ点滴静注液 生理食塩液 50mL	1mg/kg 1本	点滴静注	末梢側管	30分	11:00							
								※インラインフィルター使用 まずボトルから生理食塩水30mLを抜き取る。その後必要量の ヤーボイ溶液を加える。1~4mg/mL濃度にする必要がある。						
7		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢側管	30分	11:30							
8		デキサート注(デキサメタゾンとして) ポラミン注 5mg ファモチジン注 20mg グラニセトロンバッグ 3mg	6.6mg 1A 1A 1本	点滴静注	末梢側管	15分	12:00							
9 *		パクリタキセル点滴静注液 5%ブドウ糖液 500mL	180mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管	3時間	12:15							
								※インラインフィルター						
10 *		カルボプラチン点滴静注液 生理食塩液 500mL	AUC5 1本	点滴静注	末梢側管	2時間	15:15							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
4	オブジーボ点滴静注	360mg/body	
6	ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	
9	パクリタキセル点滴静注液	180mg/m ²	
10	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	400mg/m ²

<備考>