

レジメン名称：乳癌 EC

適応がん種：乳癌
 インターバル日数：21日
 予定コース数：

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00							
2		イメドカプセル 125mg	1C	内服	経口		○							
3		イメドカプセル 80mg	1C	内服	経口			午前中	午前中					
4		デキサート注(デキサメタゾンとして) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	8.25mg 1本	点滴静注	末梢側管	15分	10:00							
5 *		エピルビシン塩酸塩注射液 生理食塩液 100mL	90mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管	10分 ※NS50mL抜く	10:15							
6 *		注射用エンドキサン 生理食塩液 100mL	600mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管	30分 ※ファシール使用	10:25							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
6	エピルビシン塩酸塩注射液	90mg/m ²	
7	注射用エンドキサン	600mg/m ²	

<備考>