

レジメン名称：乳癌 FEC

適応がん種：乳癌  
 インターバル日数：21日  
 予定コース数：6コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00						
2		デキサート注(デキサメタゾンとして) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	8.25mg 1本	点滴静注	末梢側管	15分	10:00						
3	*	エピルビシン塩酸塩注射液 生理食塩液 100mL	100mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	末梢側管	10分 ※NS50mL抜く	10:15						
4	*	注射用エンドキサン 生理食塩液 100mL	500mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	末梢側管	30分 ※ファシール使用	10:25						
5	*	フルオロウラシル注 生理食塩液 50mL	500mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	末梢側管	5分	10:55						

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
3	エピルビシン塩酸塩注射液	100mg/m <sup>2</sup>	
4	注射用エンドキサン	500mg/m <sup>2</sup>	
5	フルオロウラシル注	500mg/m <sup>2</sup>	

<備考>  
 ・イメドカプセル(day1:125mg、day2,3:80mg)  
 イメドカプセル(125mg)はエピルビシン開始1時間前までに服用  
 ・ベタメタゾン錠(day2,3:0.5mg)  
 ・新「化学療法レジメンセット登録用紙」へ変更(2018.2)