レジメン名称 ： 乳癌 HP+Eribulin<初回用>(HER 90分)

適応がん種 ： HER2陽性乳癌
インターバル日数 ： 21日
予定コース数 ： PDになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00	10:00						
2	＊	パージェタ点滴静注	840mg/body	点滴静注	末梢側管	1時間	10:00							
		生理食塩液 250mL	1本											
3	＊	ハーセプチン注射用	8mg/㎡	点滴静注	末梢側管	90分	11:00							
		生理食塩液 250mL	1本											
4		デキサート注（デキサメタゾンとして）	6.6mg	点滴静注	末梢側管	15分	12:30	10:00						
		生理食塩液 50mL	1本											
5	＊	ハラヴェン静注	1.4mg/㎡	点滴静注	末梢側管	5分	12:45	10:15						
		生理食塩液 50mL	1本											

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	パージェタ点滴静注	840mg/body	840mg/body
3	ハーセプチン注射用	8mg/㎡	
5	ハラヴェン静注	1.4mg/㎡	

＜備考＞