

レジメン名称：乳癌 HP+Eribulin(HER 30分)

適応がん種：HER2陽性乳癌

インターバル日数：21日

予定コース数：PDになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00	10:00						
2	*	パージェタ点滴静注 生理食塩液 250mL	420mg/body 1本	点滴静注	末梢側管	30分	10:00							
		※前回投与日から6週以上経過したら、初回投与量の840mg/body投与する												
3	*	ハーセプチン注射用 生理食塩液 250mL	6mg/kg 1本	点滴静注	末梢側管	30分	10:30							
4		デキサート注(デキサメタゾンとして) 生理食塩液 50mL	6.6mg 1本	点滴静注	末梢側管	15分	11:00	10:00						
5	*	ハラヴェン静注 生理食塩液 50mL	1.4mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管	5分	11:15	10:15						

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	パージェタ点滴静注	420mg/body	840mg/body
3	ハーセプチン注射用	6mg/kg	
5	ハラヴェン静注	1.4mg/m ²	

<備考>