

レジメン名称：大腸癌 Bev+FOLFOX<初回用>(Bev90分)

適応がん種：大腸癌
 インターバル日数：14日
 予定コース数：PDIになるまで

| Rp.No. | 癌 | 薬剤名 | 投与量 | 手技 | 投与経路 | 点滴時間・速度 | day(1) | day() | day() | day() | day() | day() | day() |
|--------|---|--|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | | 生理食塩液 20mL | 1本 | 点滴静注 | CVポート(メイン) | ラインキープ用 | 10:00 | | | | | | |
| 2 | * | アバスタチン点滴静注用 生理食塩液 100mL | 5mg/kg 1本 | 点滴静注 | CVポート(メイン) | 90分 | 10:00 | | | | | | |
| 3 | | デキサート注(デキサメタゾンとして) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg | 6.6mg 1本 | 点滴静注 | CVポート(メイン) | 15分 | 11:30 | | | | | | |
| 4 | * | オキサリプラチン注射液 5%ブドウ糖液 250mL | 85mg/m ² 1本 | 点滴静注 | CVポート(メイン) | 2時間 | 11:45 | | | | | | |
| 5 | * | レボホリナート点滴静注用 5%ブドウ糖液 250mL | 200mg/m ² 1本 | 点滴静注 | CVポート(側管) | 2時間 | 11:45 | | | | | | |
| 6 | * | フルオロウラシル注 | 400mg/m ² | 静脈注射 | CVポート(メイン) | 3分 | 13:45 | | | | | | |
| 7 | * | フルオロウラシル注 生理食塩液 100mL | 2400mg/m ² 1本 | 点滴静注 | CVポート(メイン) | 46時間 ※総量100mL 注入器具:シアーフューザー | 13:48 | | | | | | |
| 8 | | 生食注シリンジ 10mL | 1本 | ヘパリンロック | CVポート(メイン) | 抜針時のラインフラッシュ用 | | | | | | | |

上記表にて設定する抗がん剤について

| Rp.No. | 薬剤名 | 設定値 | 上限値 |
|--------|--------------|-----------------------|---------|
| 2 | アバスタチン点滴静注用 | 5mg/kg | 10mg/kg |
| 4 | オキサリプラチン注射液 | 85mg/m ² | |
| 5 | レボホリナート点滴静注用 | 200mg/m ² | |
| 6 | フルオロウラシル注 | 400mg/m ² | |
| 7 | フルオロウラシル注 | 2400mg/m ² | |
| | | | |

<備考>