

レジメン名称：大腸癌 sLV5-FU2(5-FU/I-LV)

適応がん種：大腸癌
 インターバル日数：14日
 予定コース数：PDIになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 20mL	1本	点滴静注	CVポート(メイン)	ラインキープ用	10:00						
2		デキサート注(デキサメタゾンとして) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	6.6mg 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	15分	10:00						
3	*	レボホリナート点滴静注用 5%ブドウ糖液 250mL	200mg/m ² 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	2時間	10:15						
4	*	フルオロウラシル注	400mg/m ²	静脈注射	CVポート(メイン)	3分	12:15						
5	*	フルオロウラシル注 生理食塩液 100mL	2400mg/m ² 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	46時間 ※総量100mL 注入器具:シュア-フューザー	12:18						
6		生食注シリンジ 10mL	1本	ヘパリンロック	CVポート(メイン)	抜針時のラインフラッシュ用							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
3	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	
4	フルオロウラシル注	400mg/m ²	
5	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	

<備考>