

レジメン名称：大腸癌 Cetu+FOLFIRI(Cetu60分)

適応がん種：EGFR陽性の進行・再発大腸癌

インターバル日数：14日

予定コース数：PDになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 20mL	1本	点滴静注	CVポート(メイン)	ラインキープ用	10:00	10:00						
2		デキサート注(デキサメタゾンとして) ポララミン注 5mg アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	6.6mg 1A 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	15分	10:00							
3		デキサート注(デキサメタゾンとして) ポララミン注 5mg 生理食塩液 50mL	6.6mg 1A 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	15分		10:00						
4 *		アービタックス注射液 生理食塩液 250mL	250mg/m ² (2回目以降) 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	1時間 ※総量250mL	10:15	10:15						
5		生理食塩液 250mL	1本	点滴静注	CVポート(メイン)	1時間 ※経過観察用	11:15	11:15						
6 *		イリノテカン塩酸塩点滴静注液 5%ブドウ糖液 250mL	150mg/m ² 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	90分	12:15							
7 *		レボホリナート点滴静注用 5%ブドウ糖液 250mL	200mg/m ² 1本	点滴静注	CVポート(側管)	2時間	12:15							
8 *		フルオロウラシル注	400mg/m ²	静脈注射	CVポート(メイン)	3分	14:15							
9 *		フルオロウラシル注 生理食塩液 100mL	2400mg/m ² 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	46時間 ※総量100mL 注入器具:シユア-フューザー	14:18							
10		生食注シリンジ 10mL	1本	ヘパリンロック	CVポート(メイン)	抜針時のラインフラッシュ用								

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
4	アービタックス注射液	250mg/m ²	
6	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	150mg/m ²	
7	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	
8	フルオロウラシル注	400mg/m ²	
9	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	

<備考>
