

レジメン名称：大腸癌 Cetu+CPT-11<初回用>(Cetu day1 120分)

適応がん種：EGFR陽性の進行・再発大腸癌

インターバル日数：14日

予定コース数：PDIになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00	10:00						
2		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢側管	15分	10:00							
		ポララミン注 5mg	1A											
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1本											
3		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢側管	15分		10:00						
		ポララミン注 5mg	1A											
		生理食塩液 50mL	1本											
4 *		アービタックス注射液	400mg/m ² (初回)	点滴静注	末梢側管	2時間	10:15							
		生理食塩液 500mL	1本			※総量500mL								
5 *		アービタックス注射液	250mg/m ² (2回目以降)	点滴静注	末梢側管	1時間		10:15						
		生理食塩液 250mL	1本			※総量250mL								
6		生理食塩液 250mL	1本	点滴静注	末梢側管	1時間	12:15	11:15						
						※経過観察用								
7 *		イリノテカン塩酸塩点滴静注液	150mg/m ²	点滴静注	末梢側管	90分	13:15							
		5%ブドウ糖液 250mL	1本											

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
4	アービタックス注射液	400mg/m ² (初回)	
5	アービタックス注射液	250mg/m ² (2回目以降)	
7	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	150mg/m ²	

<備考>