

レジメン名称：大腸癌 Pani+FOLFOX

適応がん種：大腸癌
 インターバル日数：14日
 予定コース数：PDIになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 20mL	1本	点滴静注	CVポート(メイン)	ラインキープ用	10:00						
2	*	ベクティビックス点滴静注	6mg/kg	点滴静注	CVポート(メイン)	1時間	10:00						
		生理食塩液 100mL	1本			※総量100mL ※インラインフィルター							
3		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	CVポート(メイン)	1時間	11:00						
						※経過観察用							
4		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg 1本	点滴静注	CVポート(メイン)	15分	12:00						
5	*	オキサリプラチン注射液	85mg/m ²	点滴静注	CVポート(メイン)	2時間	12:15						
		5%ブドウ糖液 250mL	1本										
6	*	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴静注	CVポート(側管)	2時間	12:15						
		5%ブドウ糖液 250mL	1本										
7	*	フルオロウラシル注	400mg/m ²	静脈注射	CVポート(メイン)	3分	14:15						
8	*	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	点滴静注	CVポート(メイン)	46時間	14:18						
		生理食塩液 100mL	1本			※総量100mL 注入器具:シユア-フューザー							
9		生食注シリンジ 10mL	1本	ヘパリンロック	CVポート(メイン)	抜針時のラインフラッシュ用							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	ベクティビックス点滴静注	6mg/kg	
5	オキサリプラチン注射液	85mg/m ²	
6	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	
7	フルオロウラシル注	400mg/m ²	
8	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	

<備考>