

レジメン名称：大腸癌 RAM+FOLFIRI(初回用RAM60分)

適応がん種：大腸癌
 インターバル日数：14日
 予定コース数：PDIになるまで

| Rp.No. | 癌 | 薬剤名 | 投与量 | 手技 | 投与経路 | 点滴時間・速度 | day(1) | day() | day() | day() | day() | day() | day() |
|--------|---|--|-----------------------------|---------|------------|------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | | 生食注シリンジ 10mL | 1本 | 点滴静注 | CVポート(メイン) | ラインキープ用 | 10:00 | | | | | | |
| 2 | | デキサート注(デキサメタゾンとして) ポララミン注 5mg アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg | 6.6mg 1A 1本 | 点滴静注 | CVポート(メイン) | 15分 | 10:00 | | | | | | |
| 3 | * | サイラムザ点滴静注液 生理食塩液 250mL | 8mg/kg 1本 | 点滴静注 | CVポート(メイン) | 1時間 ※総量250mL ※インラインフィルター | 10:15 | | | | | | |
| 4 | | 生理食塩液 50mL | 1本 | 点滴静注 | CVポート(メイン) | 5分 ※ラインフラッシュ用 | 11:15 | | | | | | |
| 5 | * | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 5%ブドウ糖液 250mL | 150mg/m ² 1本 | 点滴静注 | CVポート(メイン) | 90分 | 11:20 | | | | | | |
| 6 | * | レボホリナート点滴静注用 5%ブドウ糖液 250mL | 200mg/m ² 1本 | 点滴静注 | CVポート(側管) | 2時間 | 11:20 | | | | | | |
| 7 | * | フルオロウラシル注 | 400mg/m ² | 静脈注射 | CVポート(メイン) | 3分 | 13:20 | | | | | | |
| 8 | * | フルオロウラシル注 生理食塩液 100mL | 2400mg/m ² 1本 | 点滴静注 | CVポート(メイン) | 46時間 ※総量100mL 注入器具:シュア-フューザー | 13:23 | | | | | | |
| 9 | | ヘパリンNa注シリンジ 10mL | 1本 | ヘパリンロック | CVポート(メイン) | 抜針時のラインフラッシュ用 | | | | | | | |

上記表にて設定する抗がん剤について

| Rp.No. | 薬剤名 | 設定値 | 上限値 |
|--------|----------------|-----------------------|-----|
| 3 | サイラムザ点滴静注液 | 8mg/kg | |
| 5 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 | 150mg/m ² | |
| 6 | レボホリナート点滴静注用 | 200mg/m ² | |
| 7 | フルオロウラシル注 | 400mg/m ² | |
| 8 | フルオロウラシル注 | 2400mg/m ² | |

<備考>