

レジメン名称：大腸癌 Bev+XELIRI<初回用>(Bev90分)

適応がん種：大腸癌
 インターバル日数：21日
 予定コース数：PDIになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00						
2	*	アバスチン点滴静注用 生理食塩液 100mL	7.5mg/kg 1本	点滴静注	末梢側管	90分	10:00						
3		デキサート注(デキサメタゾンとして) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	6.6mg 1本	点滴静注	末梢側管	15分	11:30						
4	*	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 5%ブドウ糖液 250mL	200mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管	90分	11:45						
5	*	ゼロータ	1600mg/m ²	内服	経口		← day1夕～day15朝 →						

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	アバスチン点滴静注液	7.5mg/kg	
4	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	200mg/m ²	
5	ゼロータ	1600mg/m ²	

<備考>