レジメン名称 ： 大腸癌 Bev+XELIRI(Bev30分)

適応がん種 ： 大腸癌
インターバル日数 ： 21日
予定コース数 ： PDになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00							
2	＊	アバスチン点滴静注用	7.5mg/kg	点滴静注	末梢側管	30分	10:00							
		生理食塩液 100mL	1本											
3		デキサート注（デキサメタゾンとして）	6.6mg	点滴静注	末梢側管	15分	10:30							
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1本											
4	＊	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	200mg/㎡	点滴静注	末梢側管	90分	10:45							
		5%ブドウ糖液 250mL	1本											
5	＊	ゼローダ	1600mg/㎡	内服	経口		←― day1夕～day15朝―→							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	アバスチン点滴静注液	7.5mg/kg	
4	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	200mg/㎡	
5	ゼローダ	1600mg/㎡	

＜備考＞