

レジメン名称 : 大腸癌 Cete+Encorafenib+Binimetinib(Cetu60分)

適応がん種 : BRAF変異陽性の進行・再発大腸癌

インターバル日数 : 7日

予定コース数 : PDIになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00						
2		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢側管	15分	10:00						
		ポララミン注 5mg	1A										
		生理食塩液 50mL	1本										
3 *		アービタックス注射液	250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	末梢側管	1時間	10:15						
		生理食塩液 250mL	1本			※総量250mL							
4		生理食塩液 250mL	1本	点滴静注	末梢側管	1時間	11:15						
						※経過観察用							
5		ビラフトビ	300mg	1日1回	経口								
6		メクトビ	45mg	1日2回	経口								

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
3	アービタックス注射液	250mg/m <sup>2</sup>	
5	ビラフトビ	300mg	
6	メクトビ	45mg 1日2回	

<備考>