

レジメン名称：胃癌 エンハーツ2回目以降

適応がん種：HER2陽性胃癌
 インターバル日数：21日
 予定コース数：PDIになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		5%ブドウ糖液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00						
2		デキサート注(デキサメタゾンとして) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	6.6mg 1本	点滴静注	末梢側管	15分	10:00						
3		5%ブドウ糖100mL	1本	点滴静注	末梢側管	15分	10:15						
						エンハーツ溶液とアロキシ溶液が混合されるのを防ぐフラッシュ用							
4		エンハーツ点滴静注用100mg 5%ブドウ糖液100mL 注射用蒸留水20mL	6.4mg/kg 1本 1本	点滴静注	末梢側管	30分	10:30						
						1バイアル当たり5mLの注射用水で溶解し、20mg/mLの溶液とする。 インラインフィルターを使用する。 調製から投与まで4時間以内に行う。 薬剤部にて遮光して払い出す。 生食とは同時に投与しない							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
4	エンハーツ点滴静注用100mg	6.4mg/kg	

<備考>