

レジメン名称：胃癌 SOX+HER<初回用>(HER90分)

適応がん種：HER2陽性胃癌

インターバル日数：21日

予定コース数：PDになるまで

| Rp.No. | 癌 | 薬剤名 | 投与量 | 手技 | 投与経路 | 点滴時間・速度 | day(1) | day() |
|--------|---|---|----------------------------|------|-------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | | 生理食塩液100mL | 1本 | 点滴静注 | 末梢メイン | キープ&フラッシュ用 | 10:00 | | | | | | | |
| 2 * | | ハーセプチン点滴静注用 生理食塩液250mL | 8mg/kg 1本 | 点滴静注 | 末梢側管 | 90分で | 10:00 | | | | | | | |
| 3 | | デキサート注(デキサメタゾンとして) アロキシ点滴静注バッグ0.75mg | 6.6mg 1本 | 点滴静注 | 末梢側管 | 15分で | 11:30 | | | | | | | |
| 4 * | | オキサリプラチン注射液 5%ブドウ糖液 250mL | 130mg/m ² 1本 | 点滴静注 | 末梢側管 | 2時間で | 11:45 | | | | | | | |
| 5 * | | ティーエスワン配合OD錠 | 80mg/m ² | 内服 | 経口 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

上記表にて設定する抗がん剤について

| Rp.No. | 薬剤名 | 設定値 | 上限値 |
|--------|--------------|----------------------|-----------|
| 2 | ハーセプチン点滴静注用 | 8mg/kg | |
| 4 | オキサリプラチン注射液 | 130mg/m ² | |
| 5 | ティーエスワン配合OD錠 | 80mg/m ² | 120mg/day |
| | | | |

<特記事項>