

レジメン名称：胃癌 SP3+HER(プロイメント)<初回用>(HER90分)

適応がん種：HER2陽性胃癌
 インターバル日数：21日
 予定コース数：PDになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day()	day()	day()	day()
1		ソルデム1輸液 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分	9:00						
		KCL注シリンジ 10mEq	1キット										
		硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 20mL	8mL										
2		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分	10:30						
3		生理食塩液 1000mL	1本	点滴静注	末梢メイン	10時間	12:00						
4		デキサート注(デキサメタゾンとして)	9.9mg	点滴静注	末梢側管	30分	12:00						
		プロイメント点滴静注 150mg	1本										
		アロキシ静注用 0.75mg	1V										
		生理食塩液 250mL	1本										
5 *		ハーセプチン注射用	8mg/kg	点滴静注	末梢側管	90分	12:30						
		生理食塩液 250mL	1本										
6 *		シスプラチン注	60mg/m ²	点滴静注	末梢側管	2時間	14:00						
		生理食塩液 500mL	1本			※総量500mL							
7		20%マンニトール注射液 300mL	1本	点滴静注	末梢側管	30分	16:00						
8		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間	22:00						
9		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢側管	30分		10:00	10:00				
		生理食塩液 100mL	1本										
10		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	2時間		10:30	10:30				
11		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	2時間		12:30	12:30				
12		ヘパリンNaロック用シリンジ 500単位	1本	ヘパリンロック		点滴終了時		○					
13 *		ティーエスワン配合OD錠	80mg/m ²	内服	経口		← day1~day14 →						

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
5	ハーセプチン注射用	8mg/kg	
6	シスプラチン注	60mg/m ²	
13	ティーエスワン配合OD錠	80mg/m ²	120mg/day

<備考>