

レジメン 名称 : 胃癌 XP+HER<初回用>(HER90分)

適応がん種 : HER2陽性胃癌
 インターバル日数 : 21日
 予定コース数 : ※備考参照

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day()	day()	day()	day()	day()
1		ソルデム1輸液 500mL KCL注シリンジ 10mEq 硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 20mL	1本 1キット 8mL	点滴静注	末梢メイン	90分	9:00							
2		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分	10:30							
3		生理食塩液 1000mL	1本	点滴静注	末梢メイン	10時間	12:00							
4		イメンドカプセル 125mg	1C	内服	経口	※生食開始時に	12:00							
5		イメンドカプセル 80mg	1C	内服	経口			午前中	午前中					
6	*	ハーセプチン注射用 生理食塩液 250mL	8mg/kg 1本	点滴静注	末梢側管	90分	12:00							
7		デキサート注(デキサメタゾンとして) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	9.9mg 1本	点滴静注	末梢側管	15分	13:30							
8	*	シスプラチン注 生理食塩液 500mL	80mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管	2時間 ※総量500mL	13:45							
9		20%マンニトール注射液 300mL	1本	点滴静注	末梢側管	30分	15:45							
10		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間	22:00							
11		デキサート注(デキサメタゾンとして) 生理食塩液 100mL	6.6mg 1本	点滴静注	末梢側管	30分		10:00	10:00					
12		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	2時間		10:30	10:30					
13		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	2時間		12:30	12:30					
14		ヘパリンNaロック用シリンジ 500単位	1本	ヘパリンロック		点滴終了時		○						
15		ゼローダ錠	2000mg/m ²	内服	経口		← day1~day14 →							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
6	ハーセプチン注射用	8mg/kg	
8	シスプラチン注	80mg/m ²	
15	ゼローダ錠	2000mg/m ²	

<備考>
 ・原則として6コースまでだが忍容性ある場合はPDになるまで。