

レジメン名称：食道癌 NDP+5-FU(プロイメント)

適応がん種：食道癌
 インターバル日数：28日
 予定コース数：PDになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()
1		生理食塩液 1000mL	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間	10:00							
2		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間		10:00	10:00	10:00	10:00			
3	*	フルオロウラシル注 生理食塩液 500mL	800mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管1	24時間	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00			
4		デキサート注(デキサメタゾンとして) プロイメント点滴静注 150mg 生理食塩液 250mL	6.6mg 1V 1本	点滴静注	末梢側管2	30分	10:00							
5		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1本	点滴静注	末梢側管2	30分	10:30							
6		デキサート注(デキサメタゾンとして) 生理食塩液 50mL	3.3mg	点滴静注	末梢側管2	15分		10:00	10:00	10:00				
7	*	アクプラ静注用 生理食塩液 500mL	90mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管2	90分	11:00							
8		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00			

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
3	フルオロウラシル注	800mg/m ²	
7	アクプラ静注用	90mg/m ²	

<備考>
 ・催吐リスク中等度であるが、嘔気が強い場合用としてプロイメントを併用する(day1)