

レジメン 名称 : 低分化型神経内分泌癌 CDDP+CPT-11

適応がん種 : 低分化型神経内分泌癌
 インターバル日数 : 28日
 予定コース数 : PDIになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(8)	day(15)	day()	day()	day()
1		ソルデム1輸液 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分	9:00							
		KCL注シリンジ 10mEq	1キット											
		硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 20mL	8mL											
2		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分	10:30							
3		生理食塩液 1000mL	1本	点滴静注	末梢メイン	10時間	12:00							
4		イメンドカプセル 125mg	1C	内服	経口	※生食開始時に	12:00							
5		イメンドカプセル 80mg	1C	内服	経口			午前中	午前中					
6		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	6時間				10:00	10:00			
7		デキサート注(デキサメタゾンとして)	9.9mg	点滴静注	末梢側管	15分	13:00							
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1本											
8		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢側管	15分				10:00	10:00			
		生理食塩液 50mL	1本											
9 *		イリノテカン塩酸塩点滴静注液	60mg/m ²	点滴静注	末梢側管	90分	13:15			10:15	10:15			
		5%ブドウ糖液 250mL	1本											
10 *		シスプラチン注	60mg/m ²	点滴静注	末梢側管	2時間	14:45							
		生理食塩液 500mL	1本			※総量500mL								
11		20%マンニトール注射液 300mL	1本	点滴静注	末梢側管	30分	16:45							
12		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間	22:00							
13		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢メイン	30分		10:00	10:00					
		生理食塩液 100mL	1本											
14		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	2時間		10:30	10:30					
15		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	2時間		12:30	12:30					
16		ヘパリンNaロック用シリンジ 500単位	1本	ヘパリンロック		点滴終了時		○						

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
9	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	60mg/m ²	
10	シスプラチン注	60mg/m ²	

<備考>
