レジメン名称 ： CLL リツキサン療法（2回目以降）

適応がん種 ： CLL/SLL
インターバル日数 ： 28日
予定コース数 ： 5コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		ポララミン2mg	1錠	経口	内服		9:30							
		ブルフェン100mg	2錠	経口	内服		9:30							
2		生理食塩液100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00							
3	＊	リツキサン注	500mg/㎡	点滴静注	末梢側管	100mL/hrから開始	10:00							
		生理食塩液 500mL	1本			初回投与時の副作用がないか軽微であった場合は100mL/hrから開始する。								
						30分ごとに100mL/hrずつ速度を上げる。最大400mL/hrまで可。								
						infusion reaction出現すれば投与を中断し、再開する場合は投与中止時点での投与								
						速度の半分にして再開する。								
						10倍希釈して調製する（450mg,500mg,650mg投与する場合はそれぞれ450mL,500mL,								
						650mLとする）。700mgを超える場合はテルモ生食1Lのバッグで調製する。								

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
3	リツキサン点滴静注液	500mg/㎡	500mg/㎡

＜備考＞