

レジメン名称：多発性骨髄腫 KRD療法 1サイクル目

適応がん種：多発性骨髄腫  
 インターバル日数：28日  
 予定コース数：1コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day()	day()
1		生理食塩液 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	5時間	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
2	*	カイプロリス注 注射用水 20mL/A 5%ブドウ糖液 100mL 大塚糖液5% 100mLから20mL抜いて破棄する	20mg/m <sup>2</sup> 1A 1本	点滴静注	末梢側管	10分	10:00	10:00						
3	*	カイプロリス注 注射用水 20mL/A 5%ブドウ糖液 100mL 大塚糖液5% 100mLから20mL抜いて破棄する	27mg/m <sup>2</sup> 1A 1本	点滴静注	末梢側管	10分			10:00	10:00	10:00	10:00		
4	*	レブラミドカプセル	25mg	内服	経口	1日1回 21日間(day1-21)								
5		レナデックス錠	40mg	内服	経口	4日間(day1,8,15,22)								

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	カイプロリス注	20mg/m <sup>2</sup>	44mg/body
3	カイプロリス注	27mg/m <sup>2</sup>	59.4mg/body
4	レブラミドカプセル	25mg/body	25mg/body

<備考>  
 カイプロリス BSA2.2m<sup>2</sup>以上の場合は2.2m<sup>2</sup>で算出する