

レジメン名称：多発性骨髄腫 ERD療法 3サイクル目以降

適応がん種：多発性骨髄腫
 インターバル日数：28日
 予定コース数：PDまで

| Rp.No. | 癌 | 薬剤名 | 投与量 | 手技 | 投与経路 | 点滴時間・速度 | day(1) | day(8) | day(15) | day(22) | day() | day() | day() | day() |
|--------|---|---|--------------------|------|-------|----------|----------------------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | | ポラミン2mg | 1錠 | 経口 | 内服 | | 10:00 | | 10:00 | | | | | |
| | | ブルフェン100mg | 2錠 | 経口 | 内服 | | 10:00 | | 10:00 | | | | | |
| 2 | | 生理食塩液250mL | 1本 | 点滴静注 | 末梢メイン | ラインキープ用 | 10:00 | | 10:00 | | | | | |
| 3 | | 生理食塩液50mL | 1本 | 点滴静注 | 末梢側管 | 15分で | 10:00 | | 10:00 | | | | | |
| | | ファモチジン注射液20mg | 1A | | | | | | | | | | | |
| | | デキサート注(デキサメタゾンとして) | 6.6mg | | | | | | | | | | | |
| 4 | * | 生理食塩液250mL | 250mL | 点滴静注 | 末梢側管 | 300mL/hr | 11:00 | | 11:00 | | | | | |
| | | エムプリシティ点滴静注 注射用水 | 10mg/kg 13~17mL | | | | | | | | | | | |
| | | *エムプリシティ300mgは13mL、400mgは17mLの注射用水で溶解して、必要量をNSに混注 | | | | | | | | | | | | |
| | | *体重が50kg未満の場合、NS150mLに、50~90kg未満の場合は250mLに、90kg以上の場合は350mLに溶解 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | * | レブラミド5mg | 5錠 | 経口 | 内服 | | ← day1~day21 適宜減量可 → | | | | | | | |
| 6 | | レナデックス4mg | 7錠 | 経口 | 内服 | | 8:00 | | 8:00 | | | | | |
| 7 | | レナデックス4mg | 10錠 | 経口 | 内服 | | | 8:00 | | 8:00 | | | | |

上記表にて設定する抗がん剤について

| Rp.No. | 薬剤名 | 設定値 | 上限値 |
|--------|---------|---------|------|
| 4 | エムプリシティ | 10mg/kg | |
| 5 | レブラミド | 25mg | 25mg |
| | | | |
| | | | |

<備考>

- ①エムプリシティの投与速度は300mL/hrを超えないこと
- ②レナデックスは原則エムプリシティ投与3~24hr前までに服用すること
- ③レブラミドとレナデックスは適宜減量可