

レジメン名称：多発性骨髄腫 KD療法 2サイクル目以降

適応がん種：多発性骨髄腫
 インターバル日数：28日
 予定コース数：PDまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day(23)
1		生理食塩液100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
2		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢側管	15分で	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
		デキサート注(デキサメタゾンとして)	19.8mg											
3		大塚糖液5% 100mL	1本	点滴静注	末梢側管	30分で	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15		
	*	カイプロリス 注射用蒸留水20mL	56mg/m ²											
		大塚糖液5% 100mLから20mL抜いて破棄する												
		カイプロリス10mgあたり注射用蒸留水5mLで溶解する												
4		レナデックス錠4mg	5錠	経口	内服								○	○

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
3	カイプロリス	56mg/m ²	123.2mg/body

<備考>

- ①体表面積が2.2m²を超える場合は、体表面積2.2m²として投与量を算出する
- ②day1～day16のデキサート量、day22、day23のレナデックスの投与可否は各主治医の判断とする