

レジメン名称：多発性骨髄腫 DLd療法 3～6サイクル目

適応がん種：多発性骨髄腫
 インターバル日数：28日
 予定コース数：PDまで

| Rp.No. | 癌 | 薬剤名 | 投与量 | 手技 | 投与経路 | 点滴時間・速度 | day(1) | day(2) | day(8) | day(15) | day(16) | day(22) | day() | day() |
|--------|---|--------------------------------|---------|------|-------|--------------------------|----------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 1 | | ポララミン2mg | 1錠 | 経口 | 内服 | | 10:00 | | | 10:00 | | | | |
| | | カロナール200mg | 3錠 | 経口 | 内服 | | 10:00 | | | 10:00 | | | | |
| 2 | | 生理食塩液100mL | 1本 | 点滴静注 | 末梢メイン | ラインキープ用 | 10:00 | | | 10:00 | | | | |
| 3 | | 生理食塩液50mL | 1本 | 点滴静注 | 末梢側管 | 15分で | 10:00 | | | 10:00 | | | | |
| | | デキサート注(デキサメタゾンとして) | 19.8mg | | | | | | | | | | | |
| | | Rp3投与45分後以降に投与開始 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | * | 生理食塩液500mL | 1本 | 点滴静注 | 末梢側管 | 初回投与時間(単位ml/h) | 11:00 | | | | 11:00 | | | |
| | | ダラザレックス点滴静注 | 16mg/kg | | | 60分毎に投与量を変更(100→150→200) | | | | | | | | |
| | | * total 500mLとなるようにNS抜き取り調製 | | | | | | | | | | | | |
| | | * 0.2または0.22μmのインラインフィルターを使用する | | | | | | | | | | | | |
| 5 | * | レブラミド5mg | 5錠 | 経口 | 内服 | | ← day1～day21 適宜減量可 → | | | | | | | |
| 6 | | レナデックス4mg | 5錠 | 経口 | 内服 | | | ○ | | | ○ | | | |
| 6 | | レナデックス4mg | 10錠 | 経口 | 内服 | | | | ○ | | | ○ | | |

上記表にて設定する抗がん剤について

| Rp.No. | 薬剤名 | 設定値 | 上限値 |
|--------|-------------|---------|------|
| 4 | ダラザレックス点滴静注 | 16mg/kg | |
| 5 | レブラミド | 25mg | 25mg |

<備考>

- ① 投与開始1～3時間前にステロイド、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤を投与すること
- ② 初回投与開始時から3時間以内にinfusion reactionが無い場合2回目より500mLとできる
- ③ 初回、2回目投与時に最終速度が100mL/hr以上でinfusion reaction無い場合、3回目より100mL/hrから開始できる
- ④ ダラザレックスの希釈液は投与時間も含め15時間以内に投与
- ⑤ 希釈後直ちに投与しない場合は、遮光下にて2℃～8℃で24時間保管することができる