

レジメン 名称 : ホジキンリンパ腫 A+AVD療法

適応がん種 : ホジキンリンパ腫
 インターバル日数 : 28日
 予定コース数 : 最大6コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(15)	day(16)	day(17)	day()	day()
1		イメンドカプセル125mg	1cp		内服(化学療法開始1時間前)		○			○				
2		イメンドカプセル80mg	1cp		内服(朝食後)			○	○		○	○		
3		生理食塩液 250mL	1本		点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00			10:00			
4		アロキシ静注 0.75mg/V	1V		静注	末梢側管	2分	10:00			10:00			
5	*	エクザール注 生理食塩液 50mL	6mg/m ² 1本		点滴静注	末梢側管	15分	10:00			10:00			
6	*	ドキシソルビシン注 生理食塩液 100mL	25mg/m ² 1本		点滴静注	末梢側管	30分	10:15			10:15			
7	*	ダカルバジン注 注射用水 20mL/A 生理食塩液 250mL	375mg/m ² 3A 1本		点滴静注	末梢側管	1時間	10:45			10:45			
8	*	アドセトリス点滴静注 注射用水 20mL/A 生食100mL	1.2mg/kg 2A 1本		点滴静注	末梢側管	30分	11:45			11:45			

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
5	エクザール注	6mg/m ²	6mg/m ²
6	ドキシソルビシン注	25mg/m ²	25mg/m ²
7	ダカルバジン注	375mg/m ²	375mg/m ²
8	アドセトリス点滴静注	1.2mg/kg	120mg <small>(体重100kg以上のとき)</small>

<備考>	
------	--