

レジメン名称 : 非ホジキンリンパ腫 R(90min)-THP-CVP療法(PSL点滴)

適応がん種 : 非ホジキンリンパ腫

インターバル日数 : 21日

予定コース数 : 最大8コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		ソルデム3A輸液 200mL	1本	点滴静注	末梢メイン	8時間	10:00						
2	*	リツキシマブ注 生理食塩液 250mL	375mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	末梢側管	90分	10:00						
							総量250mLにする 初めの30分は100mL/hrで、それ以後の60分は200mL/hrで 投与する。						
3		水溶性プレドニン注 生理食塩液 100mL	40mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	末梢側管	30分	11:30						
4		グラニセトロンシリンジ 3mg/本	1本	静注	末梢側管	2分	12:00						
5	*	フィルデシン注 生理食塩液 50mL	1.5mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	末梢側管	30分	12:00						
6	*	ピノルビン注 5%ブドウ糖液 100mL	30mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	末梢側管	1時間	12:30						
7	*	エンドキサン注 生理食塩液 100mL	500mg/m <sup>2</sup> 1本	点滴静注	末梢側管	1時間	13:30						
8		プレドニン錠	40mg/m <sup>2</sup>	内服	経口	4日間(day2-5)							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	リツキシマブ注	375mg/m <sup>2</sup>	375mg/m <sup>2</sup>
5	フィルデシン注	1.5mg/m <sup>2</sup>	1.5mg/m <sup>2</sup>
6	ピノルビン注	30mg/m <sup>2</sup>	30mg/m <sup>2</sup>
7	エンドキサン注	500mg/m <sup>2</sup>	500mg/m <sup>2</sup>

<備考>