

レジメン名称： 非ホジキンリンパ腫 R-トリアキシン療法2回目以降90mg/m²(R同日投与)

適応がん種： 低悪性度非ホジキンリンパ腫
 インターバル日数： 28日
 予定コース数： 6コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00	10:00						
2	*	リツキシマブ注 生理食塩液 250mL	375mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管	90分	10:00							
							総量250mLにする。初めの30分は100mL/hrで それ以後の60分は200mL/hrで投与する。							
3		イメドカプセル 125mg	1C	内服	経口		10:30							
4		イメドカプセル 80mg	1C	内服	経口			午前中	午前中					
5		デキサート注(デキサメタゾンとして) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	3.3mg 1本	点滴静注	末梢側管	15分	11:30							
6	*	トリアキシン注 生理食塩液 50mL	90mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管	10分	11:45	10:00						
							※調製後6時間以内に投与終了する							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	リツキシマブ注	375mg/m ²	375mg/m ²
6	トリアキシン注	90mg/m ²	90mg/m ²

<備考>