

レジメン名称 : 非ホジキンリンパ腫 R(90min)-CHOP療法(PSL点滴)

適応がん種 : 非ホジキンリンパ腫
 インターバル日数 : 21日
 予定コース数 : 最大8コース

| Rp.No. | 癌 | 薬剤名 | 投与量 | 手技 | 投与経路 | 点滴時間・速度 | day(1) | day() | day() | day() | day() | day() | day() |
|--------|---|--------------------------|----------------------------|------|-------|-------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | | ソルデム3A輸液 200mL | 1本 | 点滴静注 | 末梢メイン | 5時間 | 10:00 | | | | | | |
| 2 | * | リツキシマブ注 生理食塩液 250mL | 375mg/m ² 1本 | 点滴静注 | 末梢側管 | 90分 | 10:00 | | | | | | |
| | | | | | | | 総量250mLにする 初めの30分は100mL/hrで、それ以後の60分は200mL/hrで 投与する。 | | | | | | |
| 3 | | 水溶性プレドニン注 生理食塩液 100mL | 100mg 1本 | 点滴静注 | 末梢側管 | 30分 | 11:30 | | | | | | |
| | | | | | | | ※糖尿病既往の場合、40mg/m ² | | | | | | |
| 4 | | グラニセトロンシリンジ 3mg/本 | 1本 | 静注 | 末梢側管 | 2分 | 12:00 | | | | | | |
| 5 | * | オンコビン注 生理食塩液 50mL | 1.4mg/m ² 1本 | 点滴静注 | 末梢側管 | 30分 | 12:00 | | | | | | |
| 6 | * | ドキシソルビン注 生理食塩液 100mL | 50mg/m ² 1本 | 点滴静注 | 末梢側管 | 1時間 | 12:30 | | | | | | |
| 7 | * | エンドキサン注 生理食塩液 100mL | 750mg/m ² 1本 | 点滴静注 | 末梢側管 | 1時間 | 13:30 | | | | | | |
| 8 | | プレドニン錠 | 100mg | 内服 | 経口 | 4日間(day2-5) | | | | | | | |
| | | | | | | | ※糖尿病既往の場合、40mg/m ² | | | | | | |

上記表にて設定する抗がん剤について

| Rp.No. | 薬剤名 | 設定値 | 上限値 |
|--------|----------|----------------------|----------------------|
| 2 | リツキシマブ注 | 375mg/m ² | 375mg/m ² |
| 5 | オンコビン注 | 1.4mg/m ² | 2mg/body |
| 6 | ドキシソルビン注 | 50mg/m ² | 50mg/m ² |
| 7 | エンドキサン注 | 750mg/m ² | 750mg/m ² |

<備考>