

レジメン名称：PTCL A+CHP療法(PSL点滴)

適応がん種：PTCL
 インターバル日数：21日
 予定コース数：最大8コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩水250mL	1本	点滴静注	末梢メイン	4時間	10:00						
2		水溶性プレドニン注 生理食塩液 100mL	100mg 1本	点滴静注	末梢側管	30分 ※糖尿病既往の場合、40mg/m ²	10:00						
3		グラニセトロンシリンジ 3mg/本	1本	静注	末梢側管	2分	10:30						
4 *		ドキシソルビン注 生理食塩液 100mL	50mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管	1時間	10:30						
5 *		エンドキサン注 生理食塩液 100mL	750mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管	1時間	11:30						
6 *		アドセトリス注 注射用水 20mL/A 生理食塩液100mL	1.8mg/kg 2A 100mL	点滴静注	末梢側管	30分 ※体重100kgを超える場合は100kgとして投与する ※アドセトリスとしての投与量が50mg未満の場合は生食50mLを使用し、 50mg～149mgまでは生食100mLを使用し、150mg以上の場合は250mLを使用する。 *総量を50,100,250mLにする必要はない。	12:30						
7		プレドニン錠	100mg	内服	経口	4日間(day2-5) ※糖尿病既往の場合、40mg/m ²							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
4	ドキシソルビン注	50mg/m ²	50mg/m ²
5	エンドキサン注	750mg/m ²	750mg/m ²
6	アドセトリス注	1.8mg/kg	180mg

<備考>