

レジメン名称：頭頸部癌 FP+Cetu(Cetu60分)

適応がん種：頭頸部癌
 インターバル日数：<備考>参照
 予定コース数：<備考>参照

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(8)	day(15)	day()	day()
1		ソルデム1輸液 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分	9:00							
		KCL注シリンジ 10mEq	1キット											
		硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 20mL	8mL											
2	*	フルオロウラシル注	700mg/m ²	点滴静注	末梢側管1	24時間	10:00	10:00	10:00	10:00				
		生理食塩液 500mL	1本											
3		生理食塩液 1000mL	1本	点滴静注	末梢メイン	10時間(残捨て)	10:30							
4		イメドカプセル 125mg	1C	内服	経口	※シスプラチン投与 1時間前までに服用								
5		イメドカプセル 80mg	1C	内服	経口			午前中	午前中					
6		デキサート注(デキサメタゾンとして)	9.9mg	点滴静注	末梢側管2	15分	10:30							
		ポラミン注 5mg	1A											
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1本											
7	*	アービタックス注射液	250mg/m ²	点滴静注	末梢側管2	1時間	10:45				10:15	10:15		
		生理食塩液 250mL	1本			※総量250mL								
8		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢側管2	10分	11:45							
9	*	シスプラチン注	70mg/m ²	点滴静注	末梢側管2	2時間	12:00							
		生理食塩液 500mL	1本			※総量500mL								
10		20%マンニトール注射液 300mL	1本	点滴静注	末梢側管2	30分	14:00							
11		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間	22:00	22:00	22:00	22:00				
12		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢側管2	30分		10:00	10:00	10:00				
		生理食塩液 100mL	1本											
13		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間		10:00	10:00	10:00				
14		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用					10:00	10:00		
15		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢側管	15分					10:00	10:00		
		ポラミン注 5mg	1A											
		生理食塩液 50mL	1本											
16		生理食塩液 250mL	1本	点滴静注	末梢側管	1時間					11:15	11:15		

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	フルオロウラシル注	700mg/m ²	
7	アービタックス注射液	250mg/m ²	
9	シスプラチン注	70mg/m ²	

<備考>
 ・インターバル日数：Cetu→7日、FP→21日
 ・予定コース数：FP→6コース、Cetu→PDになるまで