

レジメン名称：頭頸部癌 CDDP(100mg/m²)(放射線併用)

適応がん種：頭頸部癌
 インターバル日数：21日
 予定コース数：3コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day()	day()	day()	day()	day()
1		ソルデム1輸液 500mL KCL注シリンジ 10mEq 硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 20mL	1本 1キット 8mL	点滴静注	末梢メイン	90分	9:00							
2		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分	10:30							
3		生理食塩液 1000mL	1本	点滴静注	末梢メイン	10時間	12:00							
4		イメンドカプセル 125mg	1C	内服	経口	※生食開始時に	12:00							
5		イメンドカプセル 80mg	1C	内服	経口			午前中	午前中					
6		デキサート注(デキサメタゾンとして) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	9.9mg 1本	点滴静注	末梢側管	15分	13:00							
7 *		シスプラチン注 生理食塩液 500mL	100mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管	2時間 ※総量500mL	13:15							
8		20%マンニトール注射液 300mL	1本	点滴静注	末梢側管	30分	15:15							
9		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間	22:00							
10		デキサート注(デキサメタゾンとして) 生理食塩液 100mL	6.6mg 1本	点滴静注	末梢メイン	30分		10:00	10:00					
11		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	2時間		10:30	10:30					
12		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	2時間		12:30	12:30					
13		ヘパリンNaロック用シリンジ 500単位	1本	ヘパリンロック		点滴終了時		○						

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
7	シスプラチン注	100mg/m ²	

<備考>

・CDDP(70mg/m²)のレジメンも併存