

レジメン名称：尿路上皮癌 GC

適応がん種：尿路上皮癌
 インターバル日数：28日
 予定コース数：

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(8)	day(15)	day()	day()
1		ラクテック注 1000mL	1本	点滴静注	CVメイン	12時間	10:00		10:00	10:00				
2		トリフリード輸液 1000mL	1本	点滴静注	CVメイン	12時間 ※day2 ソルデム1 切替時に残捨て	22:00	22:00	22:00					
3		デキサート注(デキサメタゾンとして) 生理食塩液 50mL	3.3mg 1本	点滴静注	CV側管 (day8,15 末梢側管)	15分	10:00				10:00	10:00		
4 *		ゲムシタビン点滴静注用 5%ブドウ糖液 100mL	1000mg/m ² 1本	点滴静注	CV側管 (day8,15 末梢側管)	30分 total100mLにする	10:15				10:15	10:15		
5		ソルデム1輸液 500mL KCL注シリンジ 10mEq 硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 20mL	1本 1キット 8mL	点滴静注	CVメイン	90分		9:00						
6		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	CVメイン	90分		10:30						
7		生理食塩液 1000mL	1本	点滴静注	CVメイン	10時間		12:00						
8		イメンドカプセル 125mg	1C	内服	経口	※生食開始時に		12:00						
9		イメンドカプセル 80mg	1C	内服	経口					午前中	午前中			
10		デキサート注(デキサメタゾンとして) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	9.9mg 1本	点滴静注	CV側管	15分		13:00						
11 *		シスプラチン注 生理食塩液 500mL	70mg/m ² 1本	点滴静注	CV側管	2時間 ※総量500mL		13:15						
12		20%マンニトール注射液 300mL	1本	点滴静注	CV側管	30分		15:15						
13		デキサート注(デキサメタゾンとして) 生理食塩液 100mL	6.6mg 1本	点滴静注	CV側管	15分			10:00	10:00				
14		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用					10:00	10:00		

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
4	ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m ²	
11	シスプラチン注	70mg/m ²	

<備考>