

レジメン名称：尿路上皮癌 dd-MVAC

適応がん種：尿路上皮癌
 インターバル日数：14日
 予定コース数：

| Rp.No. | 癌 | 薬剤名 | 投与量 | 手技 | 投与経路 | 点滴時間・速度 | day(1) | day(2) | day(3) | day(4) | day() | day() | day() |
|--------|---|--|---------------------------|------|-------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 1 | | ラクテック注 1000mL | 1本 | 点滴静注 | CVメイン | 12時間 | 10:00 | | 10:00 | 10:00 | | | |
| 2 | | トリフリード輸液 1000mL | 1本 | 点滴静注 | CVメイン | 12時間 ※day2 ソルデム1 切替時に残捨て | 22:00 | 22:00 | 22:00 | | | | |
| 3 | * | メソトレキセート 生理食塩液 100mL | 30mg/m ² 1本 | 点滴静注 | CV側管 | 1時間 | 13:00 | | | | | | |
| 4 | | ソルデム1輸液 500mL KCL注シリンジ 10mEq 硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 20mL | 1本 1キット 8mL | 点滴静注 | CVメイン | 90分 | | 9:00 | | | | | |
| 5 | | ラクテック注 500mL | 1本 | 点滴静注 | CVメイン | 90分 | | 10:30 | | | | | |
| 6 | | デキサート注(デキサメタゾンとして) アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg | 9.9mg 1本 | 点滴静注 | CV側管 | 15分 | | 11:00 | | | | | |
| 7 | * | エクザール注射用 生理食塩液 100mL | 3mg/m ² 1本 | 点滴静注 | CV側管 | 1時間 | | 11:15 | | | | | |
| 8 | | 生理食塩液 1000mL | 1本 | 点滴静注 | CVメイン | 10時間 | | 12:00 | | | | | |
| 9 | | イメンドカプセル 125mg | 1C | 内服 | 経口 | ※生食開始時に | | 12:00 | | | | | |
| 10 | | イメンドカプセル 80mg | 1C | 内服 | 経口 | | | | 午前中 | 午前中 | | | |
| 11 | * | ドキシソルビシン注射用 生理食塩液 100mL | 30mg/m ² 1本 | 点滴静注 | CV側管 | 1時間 | | 12:15 | | | | | |
| 12 | * | シスプラチン注 生理食塩液 500mL | 70mg/m ² 1本 | 点滴静注 | CV側管 | 2時間 ※総量500mL | | 13:15 | | | | | |
| 13 | | 20%マンニトール注射液 300mL | 1本 | 点滴静注 | CV側管 | 30分 | | 15:15 | | | | | |
| 14 | | デキサート注(デキサメタゾンとして) 生理食塩液 100mL | 6.6mg 1本 | 点滴静注 | CV側管 | 15分 | | | 10:00 | 10:00 | | | |
| 15 | | ジーラスタ皮下注3.6mg | 1本 | 皮下注 | | | | | | 10:00 | | | |

上記表にて設定する抗がん剤について

| Rp.No. | 薬剤名 | 設定値 | 上限値 |
|--------|-------------|---------------------|-----|
| 3 | メソトレキセート | 30mg/m ² | |
| 7 | エクザール注射用 | 3mg/m ² | |
| 11 | ドキシソルビシン注射用 | 30mg/m ² | |
| 12 | シスプラチン注 | 70mg/m ² | |

| <備考> |
|------|
| |