レジメン名称 ： 腎細胞癌 Pembrolizumab＋Axitinib

適応がん種 ： 腎細胞癌
インターバル日数 ： 21日
予定コース数 ： PDになるまで

| Rp.No. | 癌 | 薬剤名 | 投与量 | 手技 | 投与経路 | 点滴時間・速度 | day(1) | day() | day() | day() | day() | day() | day() | day() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 生理食塩液 100mL | 1本 | 点滴静注 | 末梢メイン | ラインキープ用 | 10:00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ＊ | キイトルーダ点滴静注 | 200mg/body | 点滴静注 | 末梢側管 | 30分 | 10:00 | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 100mL | 1本 | | | ※インラインフィルター | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | インライタ錠5mg | 1日2回 | 経口 | 1回1錠1日2回 | | 連日 | | | | | | | |

上記表にて設定する抗がん剤について

| Rp.No. | 薬剤名 | 設定値 | 上限値 |
|---|---|---|---|
| 2 | キイトルーダ点滴静注 | 200mg/body | |
| 3 | インライタ錠5mg | 1回5mg | 1回10mg |

＜備考＞