

レジメン名称：悪性神経膠腫 初発TMZ単独

適応がん種：悪性神経膠腫

インターバル日数：28日

予定コース数：

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2-5)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00	10:00						
2		デキサート注(デキサメタゾンとして)	9.9mg	点滴静注	末梢側管	30分	10:00							
		プロイメンド点滴静注用 150mg	1V											
		アロキシ静注 0.75mg	1V											
		生理食塩液 250mL	1本											
3		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢側管	15分		10:00						
		生理食塩液 50mL	1本											
4 *		テモダール点滴静注用	150mg/m ²	点滴静注	末梢側管	90分	10:30	10:15						
		注射用水 100mL	1本			※1Vあたり注射用水41mLに溶解								
		生理食塩液 250mL	1本			※忍容可であれば2コース目より 200mg/m ² まで増量可								

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
4	テモダール点滴静注用	150mg/m ²	200mg/m ²

<備考>